

テンソルネットワーク法入門（実習）

東大理 大久保 毅

実習の流れ

- 実習の準備
 - 講義のgithubサイトを開く
 - ノートブックの使い方練習
- 実習0：モンテカルロシミュレーション
 - Snap shotの観察
 - 正方格子イジング模型の物理量計算
- 実習1：テンソル繰り込み
 - 正方格子イジング模型の自由エネルギー計算
 - 有限系でのモンテカルロ法との比較
- 実習2：行列積状態
 - 無限系の正方格子イジング模型の自由エネルギー計算
 - テンソル繰り込みとの比較
- 全体のまとめ

実習の準備 1 : 環境の準備

- ブラウザで講義のgithubに行く
 - <https://github.com/TsuyoshiOkubo/Introduction-to-Tensor-Network>
- このスライドのダウンロード
 - 上記サイトから「計算物理春の学校2023：テンソルネットワーク法入門（実習）.pdf」というファイルをダウンロード

実習の準備 2 : ノートブックのgoogle colabでの実行

- チュートリアルファイルの準備

- github の中身

- <https://github.com/TsuyoshiOkubo/Introduction-to-Tensor-Network>

- Exercise フォルダの中身

- Ex0-1.ipynb, Ex0-2.ipynb, Ex0-3.ipynb

- Ex1-1.ipynb, Ex1-2.ipynb, Ex1-3.ipynb

- Ex2-1.ipynb, Ex2-2.ipynb

- Ising_lib.py

- TRG_lib.py

- classical_iTEBD_lib.py

アルゴリズムのモジュール

- exact_output/ 厳密解の結果

- outputs/ 実行済み計算結果 (の一部)

実習ファイルの本体

実習の基本的な流れ

1. Ex*.ipynb をgoogle colabで開く

- 「ドライブにコピー」

2. Ex*.ipynbをそのまま実行して結果を確認

3. インプットなどを変えて、結果の変化を確認

*慣れていている方はlocal の環境で実行してもOKです。

必要なモジュール：

- numpy
- scipy
- numba

実習 0 : (比較のため)

モンテカルロシミュレーション

MCMCの実習：平衡シミュレーション


- 正方格子イジング模型のシミュレーション

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j$$

- $T=T_c$ で連続相転移

$$T_c/J = \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})}$$
$$= 2.26918531 \dots$$

- $T > T_c$: 常磁性相
- $T < T_c$: 強磁性相




- 古典モンテカルロ法（メトロポリス法）のシミュレーションを実行して、**平衡状態の物理量**、**時間変化**、**スピン配置**をみる

Ex0-1：イジング模型のシミュレーション

1. Google colabでEx0-1.ipynbを開く

実習0 モンテカルロ法 (比較のため)

• **これ**をクリック

• snapshotの観察：Ex0-1.ipynb 

• 物理量の計算：Ex0-2.ipynb 




• (optional) 有限サイズスケーリング：Ex0-3.ipynb 

2. 「ドライブにコピー」

3. ランタイム/全てのセルを実行

• 30~40秒くらいで終わるはず

• 以下の図などが出力されていればOK



Ex0-1.ipynbのinput

MCMCで正方格子イジング模型の物理量を計算します

2番目のセルでインプットパラメータを変更できます (変更したら"すべてのセルを実行")

```
[2] #Parameters for calculation
Tc = 2.0/np.log(1.0+np.sqrt(2.0))

### input parameters ###
L=32
T=2.0*Tc ## T means T/J
h = 0

algorithm="metropolis"
#algorithm="heatbath"
#algorithm = "cluster"

random_seed = None # 11
thermalization = 10000
observation = 50000

#####
```

厳密なTc (変更しない)

L: システムサイズ

T: 温度

h: 磁場 (今回は基本的に0)

アルゴリズム

乱数のタネ

(注) 同じタネだと、
同じ結果
(Noneだと毎回違う)

物理量を計算せずに、MCMCを行うstep数
(初期状態依存性を少なくするため)

物理量を計算するstep数


講義で説明した
・メトロポリス法
の他に、
・熱浴法 (*heatbath*)
・Swendsen-Wang 法 (*cluster*)
も選べます

Ex0-1.ipynbのoutput


```
[Outputs with errors estimated by Jackknife method]
T = 4.538370628426044
Energy = -0.47929273437500003 +- 0.0003877741513014861
Energy^2 = 0.2322261947631836 +- 0.00037493470656671236
Magnetization = -4.51562500000000064e-05 +- 0.00029356012661862124
Magnetization^2 = 0.003279116973876952 +- 1.9936339089795468e-05
Magnetization^4 = 3.2012081598513764e-05 +- 4.408930118636691e-07
Specific heat = 0.12452318130922689 +- 0.0009802312918727957
Susceptibility = 0.7398725349177852 +- 0.0044982688500764065
Connected Susceptibility = 0.2671902989849985 +- 0.0019568959196030276
Binder ratio = 2.9771448026203218 +- 0.021618961306956737
```

物理量と誤差 (Jackknife法)

物理量のダイナミクス



最終状態のsnapshot



実習0-1

- 温度 T を $T > T_c$, $T = T_c$, $T < T_c$ などで変えてみて、ダイナミクス、スナップショットの違いを観測する
 - 物理量によってダイナミクスが違う場合（例：低温の磁化）
- (optional) 温度を固定して L を変えてみて、ダイナミクスの違いを観測する
 - 特に $T=T_c$ 近傍で、 L の増大でダイナミクスが遅くなるはず
 - ダイナミクスが"ゆっくり"になると物理量の誤差が大きくなる

Ex0-2：温度依存性の解析

1. Google colabでEx0-1.ipynbを開く

- **これ**をクリック




2. 「ドライブにコピー」

3. ランタイム/全てのセルを実行

- 1分程で終わるはず
- 以下の図などが出力されていればOK

実習0 モンテカルロ法（比較のため）

- snapshotの観察：[Ex0-1.ipynb](#) 
- 物理量の計算：[Ex0-2.ipynb](#) 
- (optional) 有限サイズスケールリング：[Ex0-3.ipynb](#) 



Ex0-2.ipynbのinput

MCMCで正方格子イジング模型の物理量を計算します

2番目のセルでインプットパラメータを変更できます (変更したら"すべてのセルを実行")

Ex0-1.ipynbから追加・変更があった部分

```
Read_simulation_data = False ## I  
data_file = "mcddata_ex1-2.dat" ##  
|
```

Trueにすると計算はせずplotだけ

上記がTrueの時はinput_file名、
Falseの時はoutput file名

```
#Parameters for calculation  
L_list=[8,16,32]  
T_list=np.arange(2.0,2.7,0.02) #  
T_list_all = []  
for L in L_list:  
    T_list_all.append(T_list)  
"""
```

計算するLのリスト (この例では、L=8, 16,32を計算)

計算するTの生成。この例では、
T_min = 2.0, T_max = 2.7で
温度間隔 T_step = 0.02の計算


原理的にはL毎に異なる温度セットで計算できる
(今の書き方では、全てのLで共通の温度セット)

実行結果のダウンロード

Google colabのセッションが終了するとdata_fileなどは消えます。


必要であれば、適宜ダウンロード

1. **これ**をクリック



2. **これ**をクリックして
ダウンロードを選ぶ

*後でテンソル繰り込み群との比較に
使います





Ex0-2.ipynbのoutput

物理量の温度依存性：

- エネルギー
- 比熱
- 磁化の2乗
- 磁化率

見どころ：

- 物理量は誤差を含んでいる
 - エラーバーの大きさは、
温度、サイズ、物理量に依存
- 比熱や磁化率は T_c 近傍にピーク
 - L の増大で真の T_c に近づく



実習0-2

- モンテカルロステップ (observation) を増減させてエラーバーの変化を見よう
 - モンテカルロステップを増やすとエラーバーはちゃんと減る？
 - (初期) observation = 10000 → 40000 に変更してみると？
- リストに $L=64$ を追加して振る舞いを見よう
 - 計算時間はどうなるか？ (途中のセルに時間が出力されてる)

```
↳ CPU times: user 1min 19s, sys: 119 ms, total: 1min 19s
Wall time: 1min 19s
```

- observationを固定したままだと $L=64$ のエラーバーどうなる？

*この結果を保存しておくこと推奨

実習1：

テンソルネットワーク繰り込み群

テンソル繰り込み群

- 分配関数のテンソルネットワーク表現を粗視化していくことで、近似的に分配関数を計算する
 - 粗視化 \longleftrightarrow 実空間繰り込み群
- アルゴリズムは「特異値分解」と「テンソルの縮約」を繰り返すだけの単純なものであり、例えば、pythonの数値計算ライブラリNumPyを用いれば、非常に簡単に実装できる
- 種々の格子模型に適用可能
 - 分配関数を表すテンソルさえ準備すれば、アルゴリズム（プログラム）は種々の模型に適用可能
 - 物性分野だけでなく、素粒子・原子核分野でも近年研究が進んでいる

TRGの実習内容




- 正方格子イジング模型のシミュレーション
 1. 自由エネルギーの計算と厳密解との比較
 2. 差分による、比熱、エネルギーの計算
 3. 実習0で行ったモンテカルロシミュレーションとの比較

Ex1-1 : TRGの実行と厳密解との比較

1. Google colabでEx1-1.ipynbを開く

- **これ**をクリック



実習1 テンソル繰り込み群

- 有限系でのテンソル繰り込み群の計算1 : [Ex1-1.ipynb](#) 
- 有限系でのテンソル繰り込み群の計算2 : [Ex1-2.ipynb](#) 
- モンテカルロ法との比較 : [Ex1-3.ipynb](#) 

2. 「ドライブにコピー」

3. ランタイム/全てのセルを実行

- 数十秒で終わるはず
- 以下の図などが出力されていればOK



Ex1-1.ipynbのinput

TRGで正方格子イジング模型の物理量を計算します

2番目のセルでインプットパラメータを変更できます (変更したら"すべてのセルを実行")

```
Tc = 2.0/np.log(1.0+np.sqrt(2.0)) ## The cri
```

厳密なTc (変更しない)

```
### input parameters ###
```

```
n = 7 ## L = 2^n
```

$L=2^n$: システムサイズ。nで指定

```
T_min = 2.0
```

```
T_max = 2.7
```

```
T_step = 0.02
```

$T_{min}, T_{max}, T_{step}$: 温度

```
T_list=np.arange(T_min,T_max,T_step)
```

```
D = 4 ## bond dimension
```

D: 低ランク近似のパラメタ (ボンド次元)

```
### input parameters ###
```

Ex1-1.ipynbのoutput


TRGによる自由エネルギー

```
T, free_energy_density = 2.0 -2.0511359452135833
T, free_energy_density = 2.02 -2.0542110601942833
T, free_energy_density = 2.04 -2.0574326609027627
T, free_energy_density = 2.06 -2.0608076301385387
T, free_energy_density = 2.08 -2.0643436128975106
T, free_energy_density = 2.1 -2.068049238287201
-----
```


*厳密解は藤堂先生のexact ライブラリを使って計算しました。

<https://github.com/todo-group/exact>

差分近似で求めたエネルギー



差分近似で求めた比熱



実習1-1

- $L (=2^n)$ を変えてみて、計算時間の変化を確認する
 - n が1増えると L は2倍になるが、計算時間はどう変わるか？
- D を変えて、計算時間の変化を確認する
 - (補足情報) TRGにおけるSVDとテンソルの縮約の計算コストは $O(D^6)$
- D を変えて、物理量の精度を確認する
 - 自由エネルギーは数字を比べると分かりやすい
 - 物理量はグラフで比べるとよい
 - 物理量は差分近似で求めている。この近似精度は T_step を小さくすることで上げることができる
 - 厳密解との差は温度によってどう変わっているか？
- D を固定したまま L を変えるとどうなるか？

Ex1-2：複数サイズでのTRGの実行

1. Google colabでEx1-2.ipynbを開く




- **これ**をクリック



2. 「ドライブにコピー」

3. ランタイム/全てのセルを実行

- 数十秒で終わるはず
- 以下の図などが出力されていればOK

実習1 テンソル繰り込み群

- 有限系でのテンソル繰り込み群の計算1: [Ex1-1.ipynb](#) 
- 有限系でのテンソル繰り込み群の計算2: [Ex1-2.ipynb](#) 
- モンテカルロ法との比較: [Ex1-3.ipynb](#) 



*次の実習で使うので、実行結果 (trgdata_ex1-2_D4.dat) をダウンロードしておいてください

Ex1-2.ipynbのinput

TRGで正方格子イジング模型の物理量を計算します

2番目のセルで入力パラメータを変更できます (変更したら"すべてのセルを実行")

```
### input parameters ###
```

```
n_max = 6  
n_min = 3
```

```
T_min = 2.0  
T_max = 2.7  
T_step = 0.01
```

```
D = 4 ## bond dimension
```

```
data_file = "trgdata_ex2-2_D"+repr(D)+".dat" #  
### input parameters ###
```

$L=2^n$: システムサイズ。
n_min ~ n_maxまで計算

$T_{min}, T_{max}, T_{step}$: 温度

D : 低ランク近似のパラメータ (ボンド次元)


data_file: 計算結果を記録するファイル名。
ここでは、 D に応じて違う名前になるようにしている

*google colabのセッションが終了するとdata_fileなどは消えます。


必要であれば、適宜ダウンロードしてください

Ex1-2.ipynbのoutput

差分近似で求めたエネルギー



差分近似で求めた比熱



見どころ：

- 物理量には統計誤差はなく、データは滑らか
 - Dによっては、自由エネルギーの不連続性に起因する異常が出る場合もある

実習1-2 (1-1でやっていればやらなくても良い)

- D や T_{step} を変えて、物理量の変化を確認する
- 大きな L の計算も行い、物理量の L 依存性を確認する
 - 大きな L で比熱は発散するだろうか？

Ex1-3：モンテカルロ法とTRGの比較

1. Google colabでEx1-2.ipynbを開く

- **これ**をクリック

2. 「ドライブにコピー」

3. ファイルのアップロード




これをクリックして
保存しておいた


*mc_ex0-2.dat*と*trg_ex1-2_D4.dat*を

アップロード

(実はuploadしなくても、githubから
事前に計算した結果を自動でダウンロード
してくれると思います。)

実習1 テンソル繰り込み群

- 有限系でのテンソル繰り込み群の計算1: [Ex1-1.ipynb](#) 
- 有限系でのテンソル繰り込み群の計算2: [Ex1-2.ipynb](#) 
- モンテカルロ法との比較: [Ex1-3.ipynb](#) 




Ex1-3：モンテカルロ法とTRGの比較

1. Google colabでEx1-3.ipynbを開く

2. **これ**をクリック

(接続するまで少し待つ)




3. **これ**をクリックして
保存しておいた

*mc_ex0-2.dat*と*trg_ex2-2_D4.dat*を
アップロード





(保存し忘れてた場合は、再度計算するか、
配布ファイルの"outputs/"の中のものを使う)



Ex1-3：モンテカルロ法とTRGの比較

4. 上部メニューから"ランタイム/すべてのセルを実行"を選ぶ

- すぐに終わるはず
- 下の方までスクロールして、以下の図などが出力されていればOK



Ex1-3.ipynbのinput

モンテカルロ法とTRG結果を読みこんでプロットします

2番目のセルでインプットパラメタを変更できます (変更したら"すべてのセルを実行")

```
## plot temperature range
T_min = 2.1
T_max = 2.4

## data file
mc_data = "mcdata_ex1-3.dat" ## MC simulation data
trg_data = "trgdata_ex2-2_D4.dat" ## MC simulation data
```

T_{min} , T_{max} : プロットする温度範囲

結果が記録されているファイル名

(注)

モンテカルロ法とTRGで、同じ L が計算されていることを仮定しています。

L のセットがずれていると、プロットした際に、



- ・ 凡例が正しくなくなる
- ・ 異なる L が同じ色になる

などの不具合が生じます。

温度範囲、刻みは異なっていて問題ありません。

Ex1-3.ipynbのoutput

モンテカルロ法とTRGによって得られたエネルギー・比熱を同時プロット



見どころ：

- モンテカルロ法とTRGの結果、 L, D によってはズレが大きい場合がある

実習3

- 以前のEx1-2.ipynbやEx2-2.ipynbでパラメタを変えて実行した結果をプロットしてみよう
 - 計算結果をアップロードして、読み込むファイル名を適切に変更して実行すればよい。
 - モンテカルロ法とTRGのズレは、計算のパラメタによってどう変わるだろうか？
 - TRGには系統誤差が、モンテカルロ法には統計誤差があることに注意

実習2：

行列積状態法

行列積状態法

- ベクトル（テンソル）を行列の積で分解して近似する表現方法
 - 行列積状態（MPS）、tensor train decomposition
- 分配関数のテンソルネットワーク表現の縮約において、転送行列の固有ベクトルを計算する際に利用可能
 - 今回は特に、iMPSを用いて、無限系の計算を行う
- 対応するMPSの計算は、逐次的に転送行列をかけていけば良い
 - 転送行列をかける計算は、iTEBDで効率的に近似できる。

行列積状態の実習内容

- 無限系の正方格子イジング模型のシミュレーション
 1. 自由エネルギー（と磁化）の計算と厳密解との比較
 2. テンソル繰り込み群との比較

Ex2-1：行列積状態計算の実行と厳密解との比較

1. Google colabでEx2-1.ipynbを開く **実習2 行列状態法**

• **これ**をクリック

• 無限系でのiTEBDによる計算：[Ex2-1.ipynb](#)



• 行列積状態法とテンソル繰り込み群との比較：[Ex2-2.ipynb](#)




2. 「ドライブにコピー」



Ex2-1.ipynb

ファイル 編集 表示 挿入 ランタイム ツール ヘルプ


+ コード + テキスト

 ドライブにコピー

3. ランタイム/全てのセルを実行

• 2分くらいで終わるはず

• 以下の図などが出力されていればOK



Ex2-1.ipynbのinput

iTEBDで無限系の正方格子イジング模型の物理量を計算します

2番目のセルでインプットパラメタを変更できます (変更したら"すべてのセルを実行")

```
Tc = 2.0/np.log(1.0+np.sqrt(2.0)) ## The critical temp
```

厳密なTc (変更しない)

```
T_min = 2.0  
T_max = 2.7  
T_step = 0.01
```

T_min, T_max, T_step: 温度

```
chi_max = 4 ## bond dimension for iTEBD  
max_itr = 200 ## maxmun number of iteration for iTEBD  
seed = 13 ## seed for random number generator used for
```

chi_max: 低ランク近似のパラメタ
(ボンド次元)

```
data_file = "iTEBDdata_ex2-1_chi"+repr(chi_max)+".dat"  
### input parameters ###
```

max_itr: 転送行列を最大何回かけるか

```
T_list=np.arange(T_min,T_max,T_step)
```


seed: *iMPS*の初期テンソルを作る乱数のタネ

Ex2-1.ipynbのoutput


iTEBDによる自由エネルギー、磁化、相関長

```
## calculation has finised at 45 steps
T, free_energy_density, exact value = 2.0 -2.0515856173269604 -2.051585625389835
T, magnetization, exact value = 2.0 -0.9113203665311507 0.911319377877496
## calculate correlation length
T, correlation length 2.0 1.53226208078651
## calculation has finised at 47 steps
T, free_energy_density, exact value = 2.01 -2.053133972654274 -2.053133982646481
T, magnetization, exact value = 2.01 -0.9079491801051529 0.9079479211094439
```

相関長



差分近似で求めた比熱



実習2-1

- chi_max を変えて、計算時間の変化を確認する
 - (補足情報) iTEBDにおけるSVDとテンソルの縮約の計算コストは $O(\chi^3)$
 - (補足情報) 計算が収束するまでの回数は温度に依存する
- chi_max を変えて、物理量の精度を確認する
 - 磁化の立ち上がりの位置と厳密な T_c との関係
 - T_c 近傍の相関長の大きさ
 - ...


Ex2-2：行列積状態とTRGの比較

1. Google colabでEx2-1.ipynbを開く

実習2 行列状態法

• **これ**をクリック

• 無限系でのiTEBDによる計算：[Ex2-1.ipynb](#) 

• 行列積状態法とテンソル繰り込み群との比較：[Ex2-2.ipynb](#) 



2. 「ドライブにコピー」



3. ランタイム/全てのセルを実行

• 1分くらいで終わるはず

• 以下の図などが出力されていればOK



Ex2-2.ipynbのinput

iTEBDで無限系の正方格子イジング模型の物理量を計算します

2番目のセルで入力パラメタを変更できます (変更したら"すべてのセルを実行")

```
Tc = 2.0/np.log(1.0+np.sqrt(2.0)) ## The critical t
```

厳密なTc (変更しない)

```
T = 0.9 * Tc ## Temperature
```

T: 温度

```
### for iTEBD ###
```

```
chi_max_list = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16] ## bond di
```

chi_max_list: iTEBDのボンド次元リスト

```
max_itr = 200 ## maxmun number of iteration for iTE
```

max_itr: 転送行列を最大何回かけるか

```
seed = 13 ## seed for random number generator used
```

seed: iMPSの初期テンソルを作る乱数のタネ

```
### for TRG ###
```

```
n = 20 ## L = 2^n Note that n must be sufficiently
```

```
D_list = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16] ## bond dimensic
```

L=2ⁿ: システムサイズ。nで指定

*無限系と比較するので大きくする

```
L = 2**n
```

```
TRG_step = 2*n -1
```

```
## output files
```

```
data_file_iTEBD = "iTEBDdata_ex2-2.dat" ## Simulati
```

```
data_file = "trgdata_ex2-2_n"+repr(n)+".dat" ## Sin
```

D_list: TRGのボンド次元リスト

Ex2-2.ipynbのoutput


iTEBDによる自由エネルギー、磁化、相関長

```
## calculation has finised at 53 steps
T, free_energy_density, exact value = 2.04226678279172 -2.058386743887583 -2.0583867640251055
T, magnetization, exact value = 2.04226678279172 -0.895940335470425 0.8959375370799653
## calculate correlation length
T, correlation length 2.04226678279172 1.7597004266052616
```


TRGによる自由エネルギー

```
› T, free_energy_density = 2.04226678279172 -2.057720934733894
  T, free_energy_density = 2.04226678279172 -2.0583075284209564
  T, free energy density = 2.04226678279172 -2.0583767083674065
```

自由エネルギーの比較



自由エネルギーの誤差の比較



実習2-1

- T を変えて、自由エネルギーの精度を確認する
 - T_c に近づくとどうなるか？
 - 必要に応じて、 chi_max_list , D_list を変更する
- 計算時間と精度の関係を考えると、自由エネルギーの計算には、iTEBDとTRGどちらが効率が良いだろうか？

まとめ

- テンソルネットワーク (TN) は計算科学のいろいろな場面に現れる
 - 問題自体がTN形式で表現される。近似としてTN形式が現れる。
- TNの基本的な計算は、縮約 (行列積)、低ランク近似 (SVD)、および、固有値問題
 - 応用例：テンソル繰り込み群、固有値問題 (行列積状態)
- 今回扱わなかった話題
 - 量子多体問題への応用
 - 量子回路シミュレーション、量子計算
 - 機械学習、データ科学、...

参考文献

- テンソルネットワーク法解説記事
 - 数理科学 2022年2月号 「特集：テンソルネットワーク法の進展」、サイエンス社
 - 数理科学 2022年11月号の一部 「量子多体系とテンソルネットワーク」 大久保毅、サイエンス社
 - 「テンソルネットワーク形式の進展と応用」 西野友年, 大久保毅, 日本物理学会誌2017年10月号 (https://www.jstage.jst.go.jp/article/butsuri/72/10/72_702/_article/-char/ja/)
 - 「テンソルネットワークによる情報圧縮とフラストレート磁性体への応用」 大久保毅、物性研究 Vol. 7, No. 2 (物性若手夏の学校の講義テキスト) (<http://mercury.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~bussei.kenkyu/archives/category/2018/vol07-2>)
- テンソルネットワーク法テキスト
 - 「テンソルネットワークの基礎と応用 統計物理・量子情報・機械学習」 西野友年、サイエンス社 SGCライブラリ168 (2021).
- テンソルネットワーク法による数値計算の (お勧め) Review
 - R. Orús, “A practical introduction to tensor networks: Matrix product states and projected entangled pair states”, *Annal. Phys.* **349**, 117 (2014).